

|Акробат МЦ, СП| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 6
 |изоксадифен-0.03 |/0.4 |0.06/ | /0.7 | /0.02 |кукуруза (зерно, |МайсТер, ВДГ | | |этил | | |(общ.)| | |масло)
 - 0.2 | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 7 |Квинклорак | | | |
 /0.02 | |Фацет, КС | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 8
 |клопиралида | | | | |кукуруза (зерно) |Лорнет(R), ВР | | | | | | | - 2.0, | | | | | | | |кукуруза (масло) | | | |
 | | | | | - 0.5 | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 9 |клетодим | | | |
 |рапс (семена, |Граминион, КЭ; | | | | | | | |масло) - 0.5 |Селект, КЭ | +---+-----+-----+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 10|Кломазона | | | | |кукуруза (зерно) |Клоцет, КЭ | | | | | | | - 0.1 | |
 +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 11|клотианидин | | | | |рапс
 (семена) - |Модесто, КС; | | | | | | | |0.04; рапс |Пончо Бета, КС| | | | | | | |(масло), сахарная | | | | | | |
 |свекла - 0.1 | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 12|мандипропа-
 |0.03 |/0.2 |0.05/ | /1.0 | /0.01 |картофель - 0.5 |Ревус, КС | | |мид | | |(орг.)| | | | +---+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 13|пираклостро-| | | | |плодовые |Терсел, ВДГ | | |бин | |
 | | | |семечковые - 0.3 | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 14|С-
 метолахлор| | | | |подсолнечник |Гарда Голд, | | | | | | | |(семена) - 0.1; |КЭ | | | | | | | |подсолнечник | |
 | | | | | | |(масло) - 0.05 | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
 15|тербутилазин| | | | |подсолнечник |Гарда Голд, | | | | | | | |(семена) - 0.1; |КЭ | | | | | | | |
 |подсолнечник | | | | | | | | |(масло) - 0.05 | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 16|тефлутрин | | | | |картофель - 0.01 |Форс, Г | +---+-----+-----+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 17|тиаклоприд |0.005 | | | |яблоки - 0.3 |Калипсо, | | | | | | | |КС | +---+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 18|флудиоксонил| | | | |рапс (семена,
 |Круйзер | | | | | | | |масло) - 0.05 |Рапс, КС | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 19|форамсуль- |8.5 |/1.0 |0.3/ | /1.0 | /0.02 |кукуруза (зерно) |МайсТер, | | |фурон 8.5 | |
 |(общ.)| | | - 1.0; |ВДГ | | | | | | | |кукуруза (масло) | | | | | | | | - 0.5 | | +---+-----+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 20|хизалофоп-П-| | | | |подсолнечник |Форвард, | | |этила | | | |
 |(семена, масло); |МКЭ | | | | | | | | |соя (семена, | | | | | | | |масло) - 0.1 | | +-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в графе 2) является одним из компонентов смесового препарата, то после его торгового названия (в графе 9) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим компонентам). До косой черты указаны ПДК, после черты - ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой. В графе 5 указаны ПДК/ОДУ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, (а) - аэрозоль.