

Статья 35. Слепота, понижение зрения, аномалии цветового

зрения

+-----+

| Наименование болезней, | Категория годности к военной |

| степень нарушения | службе |

| функции +-----|

| I | II | III | IV | V |

| | графа | графа | графа | графа | графа |

+-----+

| а) острота зрения одного глаза 0,09 | - вновь принимаемые негодны |

| и ниже или его слепота при остроте | - военнослужащие негодны к |

| зрения другого глаза 0,3 и ниже, а | военной службе |

| также отсутствие глазного яблока | |

| при остроте зрения другого глаза | |

| 0,3 и ниже или острота зрения обоих | |

| глаз 0,2 и ниже | |

| | |

| б) острота зрения, одного глаза | - вновь принимаемые негодны |

| 0,09 и ниже или его слепота при | - военнослужащие: категория |

| остроте зрения другого глаза 0,4 и | годности к военной службе - |

| выше, а также отсутствие глазного | ИНД |

| яблока при остроте зрения другого | |

| глаза 0,4 и выше или острота зрения | |

| одного глаза 0,3 при остроте зрения | |

| другого глаза от 0,3 до 0,1 | |

| | |

| в) острота зрения одного глаза 0,4 | - вновь принимаемые негодны |

| при остроте зрения другого глаза от | к военной службе |

| 0,3 до 0,1 | - военнослужащие годны к |

| военной службе с |

| незначительными ограничениями |

| | |

| г) дихромазии, цветослабость III-II | - вновь принимаемые: |

| степени | | |

| | негодны | годны | не- |

| | | годны |

| | - военнослужащие годны к |

| военной службе |

+-----+

Острота зрения каждого глаза учитывается с коррекцией любыми

стеклами, в том числе и комбинированными, а также контактными

линзами, а у военнослужащих в том числе и интраокулярными линзами.

При коррекции обычными сферическими стеклами, а также при

некоррегированной анизометропии у освидетельствуемых по всем графам

Расписания болезней учитывается острота зрения с практически

переносимой бинокулярной коррекцией, т. е. с разницей в силе стекол для обоих глаз не более 2,0 дптр. Коррекция астигматизма любого вида должна быть проведена цилиндрическими или комбинированными стеклами полностью по всем меридианам.

Для диагностики форм и степеней цветоощущения применяются пороговые таблицы для исследования цветового зрения.

При цветослабости заключение выносится с учетом ТДТ.