

Статья 55. Болезни твердых тканей зубов, пульпы и

периапикальных тканей, десен и пародонта, слюнных желез, мягких тканей полости рта, языка

+-----+

| Наименование болезней, | Категория годности к военной |

| степень нарушения | службе |

| функции +-----|

| I | II | III | IV | V |

| | графа | графа | графа | графа | графа |

+-----+

| а) пародонтит, пародонтоз | - вновь принимаемые негодны |

| генерализованные тяжелой степени | - военнослужащие годны к |

| военной службе с |

| незначительными ограничениями |

| | |

| б) пародонтит, пародонтоз | - вновь принимаемые негодны |

| генерализованные средней степени, | - военнослужащие годны к |

| стоматиты, гингивиты, хейлиты и | военной службе |

| другие заболевания слизистой | |

| полости рта, слюнных желез и языка, | |

| не поддающиеся лечению | |

| | |

| в) пародонтит, пародонтоз | - вновь принимаемые негодны |

| генерализованные легкой степени | - военнослужащие годны к |

| военной службе |

+-----+

Статья применяется при наличии у освидетельствуемых генерализованной формы пародонтита, пародонтоза с частыми обострениями и абсцедированием.

Наличие пародонтита, пародонтоза устанавливается после тщательного исследования всей зубочелюстной системы с рентгенографией и выявлением сопутствующих заболеваний. При пародонтозе и пародонтите гражданам, поступающим на военную службу по контракту, рекомендуется проведение лечения перед освидетельствованием.

К пункту "а" относится пародонтит с глубиной пародонтального кармана 5 мм и более, резорбцией костной ткани лунки зуба на 2/3 длины корня, подвижностью зуба II-III степени.

К пункту "б" относятся заболевания слизистой оболочки полости рта, не поддающиеся лечению. При наличии стоматитов, хейлитов, гингивитов, лейкоплакий и других заболеваний, включая преканцерозы, гражданам, поступающим на военную службу по контракту (в образовательные учреждения), назначается лечение.

К пункту "в" относится пародонтит легкой степени, при котором глубина зубодесневого кармана до 3 мм, преимущественно в области

межзубного промежутка, имеется начальная степень деструкции костной ткани межзубных перегородок, снижение высоты межзубных перегородок менее 1/3, но подвижности зубов нет.