

Статья 62. Болезни кожи и подкожной клетчатки

+-----+

| Наименование болезней, | Категория годности к военной |
| степень нарушения | службе |
| функции +-----|
| I | II | III | IV | V |
| | графа | графа | графа | графа | графа |
+-----+-----|

а) трудно поддающиеся лечению	- вновь принимаемые негодны		
распространенные формы хронической	- военнослужащие негодны к		
экземы, псориаза, атопический	военной службе		
дерматит с распространенной			
лихенификацией кожного покрова,			
буллезные дерматозы			
б) хроническая крапивница,	- вновь принимаемые негодны		
рецидивирующие отеки Квинке,	- военнослужащие: категория		
распространенный псориаз,	годности к военной службе -		
абсцедирующая и хроническая	ИНД		
язвенная пиодермия, множественные			
конглобатные угри, атопический			
дерматит с очаговой лихенификацией			
кожного покрова, дискоидная красная			
волчанка, фотодерматиты, красный			
плоский лишай			
в) ограниченные и редко	- вновь принимаемые:		
рецидивирующие формы, экземы,			
ограниченные формы псориаза,	негодны	ИНД	не-
склеродермии, ихтиоз			годны
	- военнослужащие годны к		
	военной службе с		
	незначительными ограничениями		
г) распространенные и тотальные	- вновь принимаемые негодны		
формы гнездной алопеции и витилиго	- военнослужащие годны к		
	военной службе		
д) ксеродермия, фолликулярный	- вновь принимаемые:		
кератоз, ограниченные формы экземы			
в стойкой ремиссии, гнездной	негодны	ИНД	
алопеции витилиго			
	- военнослужащие годны к		
	военной службе		
+-----+

Под распространенной формой гнездной алопеции понимается наличие множественных (3 и более) очагов облысения диаметром не менее 10 см каждый, а при слиянии плешин - отсутствие роста волос на площади свыше 50 процентов волосистой части головы.

Под распространенной формой витилиго понимается наличие множественных (3 и более) депигментированных пятен на коже различных анатомических областей.

Под распространенной формой псориаза понимается наличие множественных (3 и более) бляшек на коже различных анатомических областей.

Под распространенной лихенификацией при atopическом дерматите понимается поражение кожи лица, локтевых, подколенных ямок, а также тотальное поражение.

К пункту "б" относятся также ограниченные и часто рецидивирующие (2 и более раз в год) формы экземы, единичные, но крупные (размером с ладонь больного и более) псориазные бляшки. Граждане, поступающие на военную службу по контракту (в образовательные учреждения), страдающие рецидивирующими отеками Квинке и (или) хронической крапивницей, в случаях безуспешного стационарного лечения и непрерывного рецидивирования волдырей (уртикарий) на протяжении не менее 2 месяцев освидетельствуются по пункту "б".

К пункту "в" относится бляшечная форма склеродермии вне зависимости от локализации, количества и размеров очагов поражения.

К редко рецидивирующим формам кожных заболеваний относятся случаи обострения не менее 1 раза на протяжении последних трех лет.

К пункту "г" также относятся очаги витилиго на лице, являющиеся косметическим дефектом.

Наличие atopического дерматита (экссудативного диатеза, детской экземы, нейродермита) в анамнезе при отсутствии рецидива в течение последних 10 лет, а также разновидности ограниченной склеродермии - "болезни белых пятен" не является основанием для применения настоящей статьи, не препятствует прохождению военной службы, поступлению в образовательные учреждения.