

Об утверждении перечня медицинских показаний для медицинской стерилизации

Приказ · № 121н · от 18.03.2009 · Министерство здравоохранения и социального развития · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации

от 18 марта 2009 г. N 121н

Об утверждении перечня медицинских показаний

для медицинской стерилизации

Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2009 г.

Регистрационный N 13787

В соответствии с пунктом 5.2.10 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю: Утвердить перечень медицинских показаний для медицинской стерилизации согласно приложению. Министр Т.А.Голикова

Приложение

П Е Р Е Ч Е Н Ь медицинских показаний для медицинской стерилизации +-----
-----+ | N | Наименование | Форма, стадии, | Код | Примечания | |п/п| заболевания
| степень, фаза |заболе- | | | | заболевания |вания по | | | | МКБ-10| | +---+-----+-----
---+-----+-----| | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | +-----+-----| |
КЛАСС I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | +-----
-----| | 1 | Туберкулез органов |Прогрессирующий |А 15 |При явлениях | | дыхания,
|двусторонний | легочно-сердечной | | |подтвержденный |туберкулез легких: | |недостаточности и | |
|бактериологически |фиброзно-кавернозный; | |(или) с достоверно | |и гистологически
|диссеминированный с |А 15.1 |подтвержденной | | |распадом; |А 15.2 |множественной | | |
|инфильтративный с |А 15.6 |лекарственной | | |распадом; | |устойчивостью | | |хроническая
|тотальная | возбудителя при | | |и субтотальная | |невозможности | | |эмпиема плевры с |
|проведения | |наличием |адекватного | | |бронхиального свища | |оперативного лечения | +---+---
-----+-----+-----+-----| | 2 |Туберкулез органов |Прогрессирующий |А 16
|При явлениях | | дыхания, не |двусторонний | легочно-сердечной | |подтвержденный |туберкулез
|легких: | |недостаточности | |бактериологически |фиброзно-кавернозный; | | |и гистологически
|диссеминированный с |А 16.1 | | |распадом; |А 16.2 | | |инфильтративный с |А 16.6 | | |
|распадом; | | | |хроническая тотальная | | |и субтотальная эмпиема| | |плевры с наличием | |
| | |бронхиального свища | | | +---+-----+-----+-----+-----+-----| | 3
|Туберкулез других |А 18 | | |органов | | | +---+-----+-----+-----+-----+-----
| | 4 |Туберкулез костей |Туберкулез |А 18.0 |Осложненный | |и суставов |позвочника, крупных |
|амилоидозом | | |костей и суставов со | |внутренних органов | | |стойким нарушением | | |
|функции органов | | | +---+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 |Туберкулез
|Прогрессирующий |А 18.1 |Осложненный | |мочеполовых |двусторонний | |специфическим | |
|органов (у женщин) |кавернозный | |поражением | | |туберкулез почек | |мочевыводящих путей | | |
| |и (или) развитием | | | |почечной | | |недостаточности | +---+-----+-----+-----+-----
---+-----+-----| | 6 |Туберкулезный |Констриктивный |А 18.8 |С развитием сердечной| |

|перикардит |перикардит | |недостаточности и при| | | |невозможности | | | |проведения | | | |
|адекватного | | | |оперативного лечения | +-----| |
КЛАСС II. Новообразования | +-----| |
|Злокачественные | |С 00-С 58| | |новообразования | |С 64-С 80| | +-----
-----| | КЛАСС III. Болезни крови и кроветворных органов | +-----
-----| |1 |Впервые | |С 91.0 | | |диагностированные | |С 92.0 | | |острые лейкозы |
|С 92.4 | | | |С 92.5 | | | |С 93.0 | | | |С 94.0 | | +---+-----+-----+-----+-----
-----| |2 |Миелодиспластичес- | |D 46 | | |кие синдромы | | | +---+-----+-----+-----+-----
---+-----| |3 |Лимфомы из группы | |С 82 | | |высокого риска | |С 83 | | | |С 84 | | | |С 85 | | |
| |С 88 | | | |С 90 | | | |С 91 | | +---+-----+-----+-----+-----| |4
|Лимфогранулематоз | |С 81 | | +---+-----+-----+-----+-----| |5
|Хронический |Терминальная стадия |С 92 | | |миелолейкоз, | | | |требующий лечения | | | |
|ингибиторами | | | |тирозинкиназ | | | +---+-----+-----+-----+-----| |6
|Хронические |Бластный криз |Д 45 | | |миелопролифератив- | |Д 47 | | |ные заболевания | |Д 47.1 | | |
| |Д 47.3 | | | |С 92.7 | | | |С 93.1 | | | |С 94.1 | | | |С 94.5 | | +---+-----+-----
+-----+-----| |7 |Апластическая |Тяжелая форма |В 61 | | |анемия | | | +---+-----
+-----+-----+-----| |8 |Гемолитические |Тяжелое |D 55 | | |анемии:
|рецидивирующее |D 56 | | |острые |течение |D 58 | | |гемолитические | |D 59 | | |кризы | | | +---+---
-----+-----+-----+-----| |9 |Идиопатическая |Хроническое непрерывно|D
69.3 | | |тромбоцитопеничес- |рецидивирующее | | |кая пурпура |течение, рефрактерное | | | |к
любым видам терапии | | | +---+-----+-----+-----+-----| |10 |Острая
атака | |E 80 | | |порфирии, при | | | |продолжительности | | | |"светлого" периода | | | |после
последней | | | |атаки менее 2 лет | | | +-----| |
КЛАСС IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания | |и нарушения обмена веществ | +---
-----| |1 |Сахарный диабет с | |E 10.2 | | |терминальной
| |E 11.2 | | |почечной | | | |недостаточностью | | | |на заместительной | | | |почечной терапии | |
| | |при невозможности | | | |трансплантации | | | |почки | | | +---+-----+-----
+-----+-----| |2 |Гиперпаратиреоз |Тяжелая форма с |E 21 | | |висцеральными и | | | |
|костными проявлениями | | | +-----| | КЛАСС V.
Психические расстройства | +-----| |1 |Тяжелые
хронические| |F 06 | | |психические | |F 1x.5 | | |расстройства со | |F 1x.6 | | |стойкими или часто | |F
1x.7 | | |обостряющимися | |F 1x.73 | | |болезненными | |F 1x.74 | | |проявлениями | |F 20.0 - | | | |
|20.9 | | | |(за ис- | | | |ключением| | | |F 20.4) | | | |F 21 | | | |F 30-39 | | | |F 42 | | | |F 70-79
| | +---+-----+-----+-----| |2 |Наследственные и | |F 0.04 | | |
|дегенеративные | |F 0.14 | | |психические | |F 0.83| | |расстройства | |F 0.84 | | +---+-----+-----
-----+-----+-----| |3 |Болезни | |F 1x.2x | | |зависимости | |2x | | | |F 1x.2x | | | |3x
| | +-----| | КЛАСС VI. Болезни нервной системы | +-----
-----| |Тяжелые | |A 81.0 | | |инвалидизирующие | |G 09
| | |некурабельные | |G 10 - | | |заболевания | |G 13.8 | | |нервной системы | |G 20 - | | |различной |
|G 26 | | |этиологии, | |G 30.0 - | | |сопровождающиеся | |31.9 | | |выраженными | |G 35 | | |
|двигательными, | |G 40.0 | | |психическими | |G 70 - | | |расстройствами | |G 73 | | | |E 83.0 | | +-----
-----| | КЛАСС VII. Болезни глаза и его придаточного
аппарата | +-----| |Злокачественные |T3-4 N0 M0 |С
43.1 | | |новообразования |T1-4 N0 M0 |С 69.0 | | |органа зрения |T1-4 N0 M1 |С 69.1 | | |
|(придаточного |T1-4 N1 M1 |С 69.2| | |аппарата, глаза, | |С 69.3 | | |орбиты) | |С 69.4 | | | |С 69.5 | | |
| |С 69.6 | | | |С 69.9 | | | |С 72.3 | | +-----| | КЛАСС
IX. Болезни системы кровообращения | +-----| |1
|Ревматические | |I 05-I 09| | |пороки сердца: | | | |а) пороки сердца, | |I 50 | | |сопровождающиеся

[illegible]

| | | | | ветвей легочной | | | | | (артерии) | | | | +---+-----+-----+-----+-----+
 - | 6 | Гипертоническая | | | | | болезнь: | | | | | а) гипертоническая | | 10 | | | | | болезнь II B - III | | | | |
 | стадий; | | | | | б) гипертоническая | | | | | болезнь при | | | | | отсутствии эффекта | | | | | от
 адекватно | | | | | проводимой терапии | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ |
 КЛАСС X. Болезни органов дыхания | +-----+-----+-----+-----+-----+ | В случае
 развития тяжелой дыхательной недостаточности независимо от характера | | первичной легочной
 патологии и/или легочной гипертензии | +-----+-----+-----+-----+-----+ |
 КЛАСС XI. Болезни органов пищеварения | +-----+-----+-----+-----+-----+ | 1
 | Печеночная | | К 73.2 | | | | | недостаточность | | К 72.0 | | | | | независимо от | | К 74.6 | | | | | первичного | | К
 76.6 | | | | | заболевания печени | | К 76.0 | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+ | 2
 | Болезнь Крона, | | К 50.8 | | | | | осложненная | | | | | стенозом, свищами, | | | | | нарушениями | | | | |
 всасывания и | | | | | кровотечениями | | | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+ |
 | 3 | Неспецифический | | К 51.0 | | | | | язвенный колит, | | | | | осложненный | | | | | токсической | | | | |
 дилатацией толстой | | | | | кишки, профузными | | | | | поносами, | | | | | массивными | | | | |
 кишечными | | | | | кровотечениями | | | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+ | 4
 | Целиакия с | | К 90.0 | | | | | Диагноз должен быть | | | | | нарушениями | | | | | подтвержден | | | | | всасывания в
 тонкой | | | | | гистологическим | | | | | кишке | | | | | исследованием тонкой | | | | | (двенадцатиперстной) | | | | |
 кишки и | | | | | иммунологическими | | | | | тестами с | | | | | определением антител | | | | | к
 глиадину и тканевой | | | | | транслугтаминазе | +---+-----+-----+-----+-----+-----+
 ----- | 5 | Грыжа брюшной | | К 43.0 | | | | | Значительных размеров | | | | | стенки | | | | | с расхождением | | | | |
 брюшной стенки при | | | | | невозможности | | | | | хирургической | | | | | коррекции | +---+-----+-----+-----+-----+
 ---+-----+-----+-----+-----+-----+ | 6 | Спаечная болезнь | | К 56.5 | | | | | кишечника с | | | | |
 приступами кишечной | | | | | непроходимости | | | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+
 ----- | 7 | Кишечные свищи | | К 63.2 | | | | | При невозможности | | | | | хирургического | | | | | лечения | +---+-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+ | КЛАСС XIII. Болезни костно-мышечной системы
 и соединительной ткани | +-----+-----+-----+-----+-----+ | 1 | Краниосиностоз |
 | Q 75.0 | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+ | 2 | Spina bifida | | Q 76.0 | | |
 | occulta | | | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+ | 3 | Врожденное полное | | Q
 71.0 | | | | | отсутствие верх- | | | | | ней(их) конечнос- | | | | | ти(ей) | | | | +---+-----+-----+-----+-----+
 --+-----+-----+-----+-----+-----+ | 4 | Врожденное полное | | Q 72.0 | | | | | отсутствие ниж- | | | | | ней(их)
 конечнос- | | | | | ти(ей) | | | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+ | 5
 | Диастрофическая | | Q 77.5 | | | | | дисплазия | | | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+
 ----- | 6 | Врожденная ломкость | | Q 78.0 | | | | | костей | | | | | (незавершенный | | | | | остеогенез) | | | | +---+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 7 | Врожденный | | Q 74.3 | | | | | множественный |
 | | | | | артрогрипоз | | | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+ | 8 | Ревматоидный
 артрит | Быстро прогрессирующее | | M 05.3 | | | | | с вовлечением | | | | | течение с | | M 06.8 | | | | | других органов и
 | неконтролируемой | | | | | систем | | | | | высокой активностью | | | | +---+-----+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 9 | Узелковый | Тяжелое течение | | M 30.0 | | | | | Полиорганное | | | | | полиартериит | |
 | поражение, в том | | | | | числе поражение почек | | | | | со злокачественной | | | | | гипертензией, | | | |
 | | | | | резистентной к | | | | | адекватной | | | | | антигипертензивной | | | | | терапии | +---+-----+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 10 | Полиартериит с | Тяжелое течение | | M 30.1 | | | | | Поражение
 легких с | | | | | поражением легких | | | | | частым кровохарканьем | | | | | (Черджа-Стросса) | | | | | и развитием | | | |
 | | | | | дыхательной | | | | | недостаточности и | | | | | генерализации | | | | | васкулита | | | |
 | (полинейропатия, | | | | | гломерулонефрит) | +---+-----+-----+-----+-----+-----+
 --- | 11 | Гранулематоз | Тяжелое течение | | M 31.3 | | | | | Поражение легких и | | | | | Вегенера | | | | | почек с
 признаками их | | | | | недостаточности | +---+-----+-----+-----+-----+-----+ |
 | 12 | Синдром дуги аорты | Тяжелое течение | | M 31.4 | | | | | Поражение аортальных | | | | | (Такаясу) | | | | | клапанов
 с симптомами | | | | | (неспецифический | | | | | недостаточности | | | | | аортоартериит) | | | | | кровообращения, | | | |

| |развитием | | | |артериальной | | | |гипертензии, | | | |аневризмы аорты | +---+-----+--
-----+-----+-----| 13 |Системная красная |Острое и хроническое |М 32.1
|Поражение почек | |волчанка |течение с частыми | |(нефрит со стойким | | |обострениями |
|нефротическим | |заболевания |синдромом и | | |артериальной | | |гипертензией), ЦНС | |
| | |(рецидивирующий | | | |эписиндром), сердца с | | | |формированием | | | |клапанных пороков,
| | |легких и симптомами | | | |нарушения функции | | | |этих органов | +---+-----+-----
-----+-----+-----| 14 |Дермато(поли)- |Тяжелое течение, |М 33.1 |Поражение сердца
с | |миозит |требующее длительной |М 33.2 |нарушениями ритма и | | |терапии высокими |
|симптомами | | |дозами |недостаточности | | |глюкокортикоидов |кровообращения | +---+-----
-----+-----+-----+-----| 15 |Прогрессирующий |Острое и хроническое |М 34.0
|Поражение почек со | |системный склероз |течение с высокой |стойкой артериальной | |
|(системная |активностью процесса |гипертензией, легких | |склеродермия) | |с развитием
легочной | | |гипертензии и | | | |нарушением их функций| +---+-----+-----+-----
-----+-----+-----| 16 |Сухой синдром |Тяжелое течение с |М 35.0 |Поражение легких, | | |(Шегрена)
|поражением жизненно |почек с признаками | |важных органов |недостаточности их | | |
|функций | +---+-----+-----+-----+-----| 17 |Антифосфолипидный
|Тяжелое течение |D 68.3 |Наличие в анамнезе | |синдром | |повторных нарушений | | |мозгового
| | |кровообращения, | | |формирование | | |клапанных пороков | | |сердца с нарушением
| | |кровообращения, | | |поражение почек со | | |стойкой артериальной | | |
|гипертензией и | | |почечной | | |недостаточностью | +---+-----+-----+-----
-+-----+-----| 18 |Геморрагический |Тяжелое рецидивирующее|D 69.8 |Поражение почек с | |
|васкулит, (пурпура |течение |развитием их | |Шенлейна-Геноха) | |недостаточности, | | |
|легких и | | |желудочно-кишечного | | |тракта | +-----+-----
-----| |КЛАСС XIV. Болезни мочеполовой системы | +-----+-----
-----| 1 |Хроническая |N 18.9 |Уровень креатинина | |почечная | |сыворотки крови до | |
|недостаточность | |зачатия при любом | |любой этиологии | |диагнозе не должен | | |
|превышать 200 | | |мкмоль/л (1,8 мг/дл) | +---+-----+-----+-----+-----
--| 2 |Единственная почка |Q 64 | |(врожденная или |часть | |оставшаяся после | | |
|нефрэктомии) при | | |азотемии, | | |артериальной | | |гипертензии, | | |туберкулезе, | | |
| |пиелонефрите, | | |гидронефрозе | | | +---+-----+-----+-----+-----
-| 3 |Экстрофия мочевого |Q 64.1 | |пузыря | | | +-----+-----
-----+

Примечание. Вопрос о медицинской стерилизации женщин решается с учетом заключения специалистов по профилю основного заболевания.

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр.

Классы заболеваний по МКБ-10.

Проведение медицинской стерилизации касается только женщин.

Касается только алкоголизма II и III стадий у женщин.

Стерилизация при семейных формах ретинобластомы.