

О внесении изменений № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации · № 51 · от 09.10.2013 ·
Утратил силу

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013
г. № 51 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2013 г., №
50)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

от 9 октября 2013 г. N 51

О внесении изменений N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест"

Зарегистрировано Минюстом России 2 декабря 2013 г.
Регистрационный N 30518

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002,
N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004,
N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52
(ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213;
N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I),
ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. II),
ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1,
ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, 4590, 4591, 4596; N 50, ст. 7359;
2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30
(ч. I), ст. 4079) и постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о
государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской
Федерации и Положения о государственном
санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004,
N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
Внести изменения N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест"<1> (приложение).

Г.Г. Онищенко

<1> Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 92,

зарегистрированным Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10966, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 N 11, зарегистрированным Минюстом России 11.03.2008, регистрационный N 11306; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 N 47, зарегистрированным Минюстом России 04.09.2008, регистрационный N 12224; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2009 N 5, зарегистрированным Минюстом России 13.02.2009, регистрационный N 13336; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.04.2009 N 25, зарегистрированным Минюстом России 19.05.2009, регистрационный N 13954; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.02.2010 N 8, зарегистрированным Минюстом России 18.03.2010, регистрационный N 16649; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 98, зарегистрированным Минюстом России 02.09.2010, регистрационный N 18339; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2010 N 42, зарегистрированным Минюстом России 21.12.2010, регистрационный N 19292; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 N 170, зарегистрированным Минюстом России 03.02.2011, регистрационный N 19692; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 N 95, зарегистрированным Минюстом России 04.10.2011, регистрационный N 21973. (Опубликованы в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 14, 17, 38; 2009, N 10, 23; 2010, N 14, 39; 2011, N 3, 8, 42. - Прим. ред.)

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ N 10

в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

1. Строку N 256 "Возгоны каменноугольного пека с содержанием бенз/а/пирена от 0,1 до 0,15%" таблицы изложить в новой редакции:

N	Наименование	N CAS	Формула	Величина
п/п	вещества			3
				ОБУВ, мг/м
256.	Возгоны	-	-	0,1
	каменноугольного			
	пека			

2. Дополнить таблицу следующими позициями:

п/п	вещества	ОБУВ,							
п/п	вещества	ОБУВ,							
1.	1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолинил)-4-[(2,3-дигидро-1,4-бензодиоксин-2-ил)карбонил]пиперазина монометансульфонат	77883-43-3	C	H	N	O	S	0,0001	
2.	2-[(2-Аминоэтокси)метил]-4-(2-хлорфенил)-6-метил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты 3-этил 5-метилового эфира малеат	88150-47-4	C	H	Cl	N	O	0,002	
3.	4-(1,1-Диметилэтил)гидроксибензол	98-54-4	C	H	O			0,01	
4.	1,1-Дихлорэтан	75-34-3	C	H	Cl			0,3	
5.	Дицетилпероксидикарбонат	26322-14-5	C	H	O			0,3	
6.	1,1'-Иминобис(пропан-2-ол)	110-97-4	C	H	NO			0,01	
7.	5-Метокси-2-[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил-1Н-бензимидазол	73590-58-6	C	H	N	O	S	0,001	
8.	Пыль каменного угля	-	-	-				0,1	
9.	Пыль концентрата хромитовой руды с содержанием диХрома триоксида до 40% (по диХром триоксиду)	-	-	-				0,15	

10. |Пыль, образующаяся | - | - | 0,4 |
 | при растворении плава | | | | |
 | |содорегенерационных | | | |
 | котлов | | | |
 | |сульфатцеллюлозного | | | |
 | производства | | | |
 |---|-----|-----|-----|-----|
 11. |Пыль, образующаяся | - | - | 0,5 |
при регенерации				
	известии			
	сульфатцеллюлозного			
 | производства | | | |
 |---|-----|-----|-----|-----|
 12. |Пыль, образующаяся | - | - | 0,4 |
 | при сжигании щелоков | | | |
 | |сульфатцеллюлозного | | | |
 | производства | | | |
 |---|-----|-----|-----|-----|
 13. |Пыль хромитовой руды | - | - | 0,15 |
 | |с содержанием диХрома | | | |
 | |триоксида до 40% (по | | | |
	диХром триоксиду)			
 14. |Транс-1,2-дихлорэтилен | 156-60-5 | C H Cl | 0,3 |
 | | | | 2 2 2 | |
 |---|-----|-----|-----|-----|
 15. |(3R,5S,6E)-7-[4-(4- | 147098-20-2 | C H F N O S Ca | 0,0005 |
 | |Фторфенил)-6-(1- | | 44 54 2 6 12 2 | |
 | |метилэтил)-2-(метил | | | |
 | |(метилсульфонил)амино)- | | | |
 | |5-пиримидинил]-3,5- | | | |
 | |дигидрокси-6-гептеновая | | | |
 | кислота | | | |
 |---|-----|-----|-----|-----|
 16. |Цис-1,2-дихлорэтилен | 156-59-2 | C H Cl | 0,3 |
			2 2 2	
 17. |1-Этенил-2-метилбензол | 611-15-4 | C H | 0,5 |
 | | | | 9 10 | |
 |---|-----|-----|-----|-----|