

Статья 40

+-----+				
Наименование болезней, Категория годности к военной службе				
степень нарушения функции +-----				
II графа II графа III графа				
+-----+-----+-----+-----				
1 2 3 4				
+-----+-----				
Глухота, глухонмота,				
понижение слуха:				
а) глухота на оба уха или - поступающие на службу - негодны;				
глухонмота; - начальствующий состав - негодны;				
б) стойкое понижение слуха - поступающие на службу - негодны;				
при отсутствии восприятия - начальствующий состав - Инд;				
шепотной речи на одно ухо и				
при восприятии шепотной речи				
на расстоянии до 3 м на				
другое ухо или стойкое				
понижение слуха при				
восприятии шепотной речи на				
расстоянии до 1 м на одно ухо				
и на расстоянии до 2 м на				
другое ухо;				
в) стойкое понижение слуха - поступающие на службу - негодны;				
при отсутствии восприятия - начальствующий состав - годны с				
шепотной речи на одно ухо и незначительными ограничениями				
при восприятии шепотной речи				
на расстоянии более 3 м на				
другое ухо или стойкое				
понижение слуха при				
восприятии шепотной речи на				
расстоянии до 2 м на одно ухо				
и на расстоянии до 3 м на				
другое ухо				
+-----+				

Пояснения к статье 40

Восприятие шепотной речи для граждан, поступающих на службу, должно быть не менее 1 м на одно ухо и 4 м на другое ухо или 3 м на оба уха. Глухота на оба уха или глухонмота должны быть удостоверены учреждениями здравоохранения, организациями или образовательными учреждениями для глухонемых. Глухотой следует считать отсутствие восприятия крика ушной раковины.

При определении степени понижения слуха необходимы, кроме обычного, исследования разговорной и шепотной речью, камертонами и тональными пороговыми аудиометриями с обязательным определением барофункции ушей.

Однократное исследование слуха недостаточно для сравнения правильности и однородности показаний освидетельствуемого. При подозрении на полную глухоту на одно или оба уха используют приемы объективного определения глухоты: применение трещотки Барани, опыт Говсеева, Хилова и др. При значительной разнице слуха производится рентгенография височных костей по Стенверсу.