

Статья 55

+-----+				
Наименование болезней, Категория годности к военной службе				
степень нарушения функции +-----				
II графа II графа III графа				
+-----+-----+-----+-----				
1 2 3 4				
+-----+-----				
Болезни твердых тканей зубов,				
пульпы и периапикальных				
тканей, десен и пародонта,				
слюнных желез, мягких тканей				
полости рта, языка:				
а) пародонтит, пародонтоз - поступающие на службу - негодны;				
генерализованный тяжелой - начальствующий состав - годны с				
степени; незначительными ограничениями;				
б) пародонтит, пародонтоз - поступающие на службу:				
генерализованный средней негодны негодны годны;				
степени, стоматиты, - начальствующий состав - годны;				
гингивиты, хейлиты и другие				
заболевания слизистой,				
полости рта, слюнных желез и				
языка, не поддающиеся				
лечению;				
в) пародонтит, пародонтоз - поступающие на службу:				
генерализованный легкой негодны годны годны;				
степени - начальствующий состав - годны				
+-----+				

Пояснения к статье 55

Основанием для применения настоящей статьи является наличие у освидетельствуемых генерализованной формы пародонтита, пародонтоза с частыми обострениями и абсцедированием.

Диагноз пародонтита, пародонтоза устанавливается после тщательного исследования всей зубочелюстной системы с рентгенографией и выявлением сопутствующих заболеваний. При пародонтозе и пародонтите граждане, поступающие на службу, направляются на лечение.

К пункту "а" относится пародонтит с глубиной пародонтального кармана 5 мм и более, резорбцией костной ткани лунки зуба на 2/3 длины корня, подвижностью зуба II-III степени.

К пункту "б" относятся заболевания слизистой оболочки полости рта, не поддающиеся лечению. При наличии стоматитов, хейлитов,

гингивитов, лейкоплакий и других заболеваний, включая преканцерозы, граждане, поступающие на службу, направляются на лечение.

К пункту "в" относится пародонтит легкой степени, при котором глубина зубодесневого кармана до 3 мм, преимущественно в области межзубного промежутка, имеется начальная степень деструкции костной ткани межзубных перегородок, снижение высоты межзубных перегородок менее 1/3, но подвижности зубов нет.