

О введении в действие гигиенических нормативов ГН 1.2.1876-06

Постановление · № 3 · от 06.03.2006 · Главный государственный санитарный врач · Действует с изменениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 6 марта 2006 г. N 3 О введении в действие гигиенических
нормативов ГН 1.2.1876-06

Зарегистрировано Минюстом России 11 апреля 2006 г.

Регистрационный N 7676

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), с изменениями, которые внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953), постановляю:

Ввести в действие с 1 мая 2006 г. гигиенические нормативы "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды. ГН 1.2.1876-06", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 марта 2006 г. в качестве дополнения N 3 к ГН 1.2.1323-03.

Г.Г.Онищенко

Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2003 N 92 "О введении в действие ГН 1.2.1323-03" (зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2003, регистрационный N 4601).

Приложение

ГИГИЕНА, ТОКСИКОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ СОДЕРЖАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ

В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дополнение N 3 к ГН 1.2.1323-03

[illegible]

|Фастак, КЭ || |циперметрин || || |горошек - |(100 г/л) || || || || |0,04* || +---+-----+-----+-----
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |5 |ацетохлор || || | |рапс семена - |Клоцет, КЭ || || || || ||
 |0,02* |(720 г/л + || || || || || |рапс масло - |60 г/л) || || || || || |0,04* || +---+-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----| |6 |беномил || || || |подсолнечник |Фундазол, || || || || || |(семена) - |СП
 || || || || || |0,1* |(500 г/кг) | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |7
 |бета- || |0,0005/ || |рапс (семена, |Бульдок, КЭ || |цифлутрин || |(общ.) || |масло) - 0,1 |(25 г/л), || || ||
 || || |Чинук, СК || || || || || |(200 г/л) | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 ----| |8 |биспирибак |0,011 |0,2 |0,01/ |1,0 |0,01 |рис - 0,1 |Номини, СК || |натрия || |(общ.) || || |(400
 г/л) | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 (семена) -|Раундап, || || || || || |0,15 |ВР; || || || || || |Раундап || || || || || |Био, ВР; || || || || || |Раундап ||
 || || || || || |Макс, ВР | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |10
 |дельтаметрин|| || |0,01 |картофель, |Децел, КЭ, || || || || || |виноград, |Децис, КЭ, || || || || || |томаты -
 0,01,|К-Обиоль, || || || || || |рапс (семена, |Бутокс, КЭ || || || || || |масло) - |(25 г/л), || || || || || |0,02*,
 |Децис || || || || || |мясо - 0,02; |Экстра, КЭ || || || || || |печень, |(125 г/л), || || || || || |почки - 0,05; |Бутокс
 50 || || || || || |жир - 0,50; |(5%) КЭ, || || || || || |молоко - 0,02 |Дельцид 4% || || || || || |КЭ | +---+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |11 |десмедифам || || || |свекла сто- |Бетанал ||
 || || || || |ловая - 0,1, |эксперт ОФ,|| || || || || |свекла са- |КЭ; Бетанал|| || || || || |харная, кор- |АМ, КЭ; || || ||
 || || || |мовая - 0,1 |Бетанал 22,|| || || || || |КЭ; Бетанал|| || || || || |Прогресс АМ|| || || || || |КЭ; Бурефен||
 || || || || || |ФД 11, КЭ | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |12 |дикват
 || || || |0,004 |картофель - |Реглон || |(дибромид) || || || |0,05* |Супер, ВР || || || || || |(150 г/л) | +---+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |13 |ивермектин |0,001 || |0,08 || для
 крупного |Ивермек, 1%|| || || || || |рогатого |ИР, Ивер- || || || || || |скота: |сект, 1% || || || || || |печень -
 0,1, |ИР, Цева- || || || || || |жир - 0,04, |мек, 1% |ИР,|| || || || || |мясо - не |Ивомек, 1% || || || || || |требуется,
 |ИР, Ивомек || || || || || |для овец и |плюс, 1% || || || || || |свиней: |ИР, Баймек,|| || || || || |печень - |1% |ИР,
 || || || || || |0,015, |Ивертин, 1%|| || || || || |жир - 0,02, |ИР, Гана- || || || || || |мясо - не |мектин, 1% || || || || ||
 || |требуется |ИР, Санто- || || || || || |мектин, ИР || || || || || |(5 мг), || || || || || |Иврмаг, 1% || || || || || ||
 |ИР, Эква- || || || || || |лан-паста | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |14 |имазалил |0,03 |0,2 |0,02/ |0,2 |0,008 |зерно хлебных |Винцит || || || |(общ.) || |злаков - 0,1
 |Форте | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |15 |имазамокс |0,25 |1,5
 |0,004/ |1,0 |0,02 |соя (семена, |Пульсар, ВР|| || || |(орг., || |масло), |(40 г/л) || || || |(общ.) || |горох || || ||
 || || || |(зерновой) - || || || || || |1,0* || | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 ----| |16 |имидаклоприд|| || || |зерно хлебных |Конфидор || || || || || |злаков - 0,1*,|Экстра, ВДГ|| || || || || ||
 |рапс (семена, |(700 г/кг),|| || || || || |масло) - 0,1* |Танрек, ВРК|| || || || || |(200 г/л), || || || || || ||
 |Имидор, ВРК|| || || || || |(200 г/л), || || || || || |Чинук, СК || || || || || |(100 г/л + || || || || || |100 г/л) | +---+-----+
 ---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |17 |карбендазим || || || |свекла
 |Колфуго || || || || || |сахарная - |Супер, ВС || || || || || |0,1, |(200 г/л) || || || || || |яблоки - нд || | +---+-----+
 ---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |18 |квизалофоп- || || || |рапс семена -
 |Пантера, КЭ || |П-тефурим || || || |0,04*, |(40 г/л) || || || || || |рапс масло - || || || || || |0,06* || | +---+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |19 |клодинафоп- |0,2 |0,01/ |0,6 |0,002 ||
 |Топик, КЭ || |пропаргил || |(общ.) || || |(80 + || || || || || |20 г/л) | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |20 |клизантел |0,03 || || |для КРС: |Клозантин, || || || || || |мышцы - 1,0;
 |ИР 5%, 10%,|| || || || || |печень - 1,0; |20%; || || || || || |почки - 3,0; |Сантомек- || || || || || |жир - 3,0; |тин,
 ИР || || || || || |для овец: || || || || || |мясо - 1,5; || || || || || |печень - 1,5; || || || || || |почки - 5,0; || || || || ||
 || |жир - 2,0 || | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |21 |ленацил
 |0,0002 || |0,001 || |0,0003 |свекла |Гексилур, || || || || |(с.-т.) || |сахарная, |СП || || || || || |столовая, |(800
 г/кг),|| || || || || |кормовая - 0,1|Гексилур, || || || || || |КС || || || || || |(545 г/л) | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 ---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |22 |лямбда- || || || |виноград - |Оперкот, || |цигалотрин ||
 || || |0,01* |СП || || || || || |(50 г/кг) | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Стр. 3 из 4

СП| ||||| |(250 г/кг) | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| 45
|трибенурон- || | 5,0/ |0,05/ | |Гранстар, | | |метил | | | |(м. р.) | |СТС | | | | | |0,02/ | |(750 г/кг) | | | | |
| |(с. с.) | | | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| 46 |феноксапроп-| | | |
| |свекла |Фуроре- | | |п-этил | | | | |сахарная, |супер 7,5 | | | | | |кормовая - |ЭМВ | | | | | |0,05 |(69
г/л) | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| 47 |флуазинам |0,002 |0,1
|0,001/ |1,0 | |картофель - |Ширлан, СК | | | | |(общ.) | | |0,025* |(500 г/кг) | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| 48 |флуазифоп- | | | | | | | | | | | | | | |соя (семена, |Фюзилад | | |п-бутил | |
| | | | |масло) - 0,04*|Форте, КЭ | | | | | | | | |(150 г/л) | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| 49 |флудиоксанил| | | | | | | | | | | | | | | |семена, |(25 г/л) | | | |
| | | | |масло) - 0,05, | | | | | | | | | | | | | | | |свекла | | | | | | | | |сахарная - | | | | | | | | |0,05
		+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	50	фосфин	нт																																												
Квикфос,									ТАБ, Г										(560 г/кг),										Фостоксин,									ТАБ, Г											
(560 г/кг);										Фостек,									ТАБ, Г										(560 г/кг);										Алфос, ТАБ,										
		Г										(560 г/кг);										Фоском,									ТАБ, Г										(560 г/кг);								
Фосфин,									ТАБ, Г										(560 г/кг)	+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----																													
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	51	хизалофоп-										томаты,	Тарга-			П-этил						картофель -	супер, КЭ																										
		0,05	(51,6 г/кг)	+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	52																																												
цимоксанил										томаты - 0,1*	Орден, СП	+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----																																					
---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	53	циперметрин										подсолнечник	Шарпей, МЭ									(семена,	(250 г/л)																										
	масло) - 0,2*			+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	54	эпоксико-																																											
0,004	0,4	0,0005/	1,0	0,001	зерно хлебных	Рекс С, КС			назол				(общ.)			злаков - 0,2,	(125																																
г/л),									сахарная	Рекс, КС,									свекла - 0,1*	Рекс Дуо,									КС									(187											
г/л +									310 г/л)	+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----	55																																						
эсфенвалерат										кукуруза	Сэмпай, КЭ									(зерно) -	(50 г/л),									0,01*;	Суминак 5%,																		
									подсолнечник	КЭ										(семена) -									0,02*										(масло)										
0,04*;											соя (семена) -									0,02*										(масло)										0,04*;									
сахарная										свекла -									0,01*;										мясо и										мясопродукты -										
		0,01;										молоко - 0,01			+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----																																		
---	56	этоксилат									2,0		Оксанол			алифатиче-									агро, Ж			ских спиртов									(750												
г/л)			С - С									8 10									+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----																												
-----	57	этофумезат									0,02		Бетанал									эксперт ОФ;									Бентала АМ,																		
КЭ;									Бетанал 22,									КЭ;									Бетанал									Прогресс,									АМ,				
КЭ; | | | | | | | | |Бурефен ФД | | | | | | | | |11, КЭ | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в графе 2) является одним из компонентов смесового препарата, то после его торгового названия (в графе 9) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим компонентам). До косой черты указаны ПДК, после черты - ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой. В графе 5 указаны ПДК/ОДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.