

О введении аптечки первой помощи (автомобильной)

Приказ · № 366 · от 11.10.1999 · Министерство здравоохранения · Утратил силу

ПРИКАЗ

Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 11 октября 1999 г. N 366

О введении аптечки первой помощи

(автомобильной) Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

13 октября 1999 г. Регистрационный N 1934

Приказом Минздравмедпрома России от 20.08.96 г. N 325 "Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)" был утвержден состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила оказания само- и взаимопомощи. За истекший период более 70 предприятий различных форм собственности наладили производство аптечек, количество которых удовлетворяет спрос владельцев транспортных средств в большинстве субъектов Российской Федерации. В развитие пункта 4 приказа Минздравмедпрома России от 20.08.96 г. N 325 "Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)" приказываю:

Ввести в действие с 1 января 2000 г. аптечку первой помощи (автомобильную), утвержденную приказом Минздравмедпрома России от 20.08.96 г. N 325 "Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)".*

* Регистрационный N Минюста России 1342 от 7.07.1997 г.

Приложение N 1

к приказу Минздравмедпрома России

от 20 августа 1996 г.

N 325

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

(автомобильная)

СОСТАВ 1. Обезболивающие, противовоспалительные и средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях 1.1. Анальгин 0,5 N 10 1 уп. 1.2. Пакет-контейнер портативный гипотермический (охлаждающий) 1 шт. 1.3. Раствор сульфацила натрия 1 фл. 1.4. Аспирин 1 уп. 2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран 2.1. Жгут для остановки артериального кровотечения с регулируемой компрессией (с давлением) для само- и взаимопомощи 1 шт. 2.2. Бинт стерильный 10*5 1 шт. 2.3. Бинт нестерильный 10*5 1 шт. 2.4. Бинт нестерильный 5*5 1 шт. 2.5. Атравматическая повязка МАГ с диоксином или нитратом серебра 8*10 для перевязки грязных ран 1 шт. 2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5*7,0 или 2*5 см 8 шт. 2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения с фурагином 6*10 см; 10*18 см 3 шт. 2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% 1 фл. 2.9. Лейкопластырь 1*500 или 2*500 или 1*250 см 1 шт. 2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный по N 1, 3, 6 1 шт. 2.11. Вата 50 г 1 уп. 3. Средства при болях в сердце 3.1. Нитроглицерин таб. N 40 или капс. N 20 (тринитралонг) 1 уп. 3.2. Валидол таб. или капс. 1 уп. 4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти 4.1. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-устройство-рот" 1 шт. 5. Средства при обмороке (коллапсе) 5.1. Аммиака раствор (нашатырный спирт) 1 фл. 6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т. д. 6.1. Энтеродез 2 шт. 6.2. Уголь активированный в таб. 1 уп. 7. Средства при стрессовых реакциях 7.1. Корвалол или настойка валерианы 1 фл. 8. Ножницы 1 шт. 9. Правила оказания само- и взаимопомощи 1 шт. 10.

Футляр 1 шт.

Не допускается произвольная замена указанных в перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.

При использовании любого средства аптечку срочно нужно дополнить.

Приказ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти N 14 за 1997 год.

Приложение N 2

к приказу Минздравмедпрома России

от 20 августа 1996 г.

N 325

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ САМО- И ВЗАИМОПОМОЩИ

1. Травма:

ушибы, переломы, вывихи - боль, припухлость, патологическая подвижность, костная крепитация, боль при осевой нагрузке, укорочение конечности, выступление отломков в рану при открытом переломе. Обезболивание (1.1), фиксация (шинами, подручными средствами или фиксация руки к туловищу, нога к ноге), холод на место травмы (1.2).

2. Раны и кровотечение:

а) Артериальное (кровь алая, вытекает пульсирующей струей). Наложить жгут (2.1) выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, наложить на рану повязку (2.2; 2.3; 2.4). Конечность зафиксировать, больному дать обезболивающее (1.1).

б) Венозное, капиллярное (кровь темная, не пульсирует). Наложить на рану салфетку (2.8 или 2.9) и давящую повязку бинтом (2.2; 2.3; 2.4), холод на место травмы (1.2).

в) На рану наложить стерильную повязку (2.2; 2.5), дать обезболивающее (1.1). Мелкие раны и ссадины обработать йодом или зеленкой (2.10) и заклеить бактерицидным пластырем (2.6; 2.7).

3. Ожоги

При обширных ожогах наложить стерильную повязку (2.2), дать обезболивающее (1.1).

4. Боли в сердце

Валидол (3.2) одну таблетку или нитроглицерин или тринитралонг (3.1) одну таблетку, 15 капель корвалола (7.1) в 50 мл воды.

5. Обморок

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт (5.1) на ватке.

6. Стрессовые реакции

Развести в 50 мл воды 30 капель корвалола (7.1) и дать выпить больному.

7. Сердечно-легочная реанимация

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание с использованием устройства (4.1) до прибытия медработника или восстановления дыхания и пульса.

8. Отравления

Промыть желудок. Развести на 100 мл воды 1 ст. ложку энтерозеда (6.1) и дать больному выпить.

9. Поражение глаз

(Попадание инородных тел и веществ). Промыть глаза водой, закапать сульфацила натрия 3-5 капель (1.4).