

Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания

Приказ · № 107 · от 28.04.2008 · Министерство природных ресурсов · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства природных ресурсов Российской Федерации

от 28 апреля 2008 г. N 107

Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания

Зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2008 г.

Регистрационный N 11775

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213) и статьей 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462; 2003, N 46, ст. 4444; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 17, ст. 1933) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания.
2. Признать утратившими силу приложения 1 и 2 к приказу Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 4 мая 1994 г. N 126 "Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов животного и растительного мира" (зарегистрирован в Минюсте России 6 июня 1994 г., регистрационный N 592).

Министр Ю.П.Трутнев

Приложение

М Е Т О Д И К А

исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания

I. Общие положения

1. Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания (далее - Методика), разработана в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213) и статьей 56

Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462; 2003, N 46, ст. 4444; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 17, ст. 1933) и предназначена для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства (далее - объекты животного мира) и среде их обитания.

Исчисление размера вреда от уничтожения, незаконного вылова или добычи водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и не относящихся к объектам рыболовства, производится согласно соответствующим таксам, утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. N 515 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 6, ст. 604; 2000, N 40, ст. 3972) и от 26 сентября 2000 г. N 724 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 40, ст. 3972).

2. Настоящая Методика применяется для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира вследствие:

- 1) уничтожения почвенных беспозвоночных животных при уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы);
- 2) уничтожения иных видов беспозвоночных животных при уничтожении их местообитаний;
- 3) уничтожения либо незаконного добывания особей соответствующего вида животных;
- 4) уничтожения либо незаконного изъятия яиц птиц или рептилий;
- 5) уничтожения либо незаконного изъятия икры амфибий.

3. Настоящая Методика применяется для исчисления размера вреда, причиненного среде обитания объектов животного мира вследствие:

- 1) уничтожения либо запечатывания почвы и подстилки, иных местообитаний беспозвоночных животных;
- 2) разрушения обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для воспроизводства (размножения);
- 3) уничтожения среды обитания объектов животного мира (уничтожение, изменение местообитаний, ухудшение условий размножения, нагула, отдыха, путей миграции объектов животного мира и др.).
4. Исчисление размера вреда, причиненного объектам животного мира и среде их обитания, осуществляется при выявлении фактов нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об охране и использовании животного мира и среды его обитания, наступление которых устанавливается по результатам государственного контроля в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, на основании натурных обследований, инструментальных определений, измерений, лабораторных анализов и экспертных оценок.

II. Исчисление размера вреда, причиненного объектам животного мира

5. При уничтожении либо незаконном добывании объектов животного мира исчисление размера вреда производится по формуле N 1:

$$B = N \times HC \times K,$$

ожм Ит

где:

B - размер вреда, причиненного объектам животного мира,
ожм руб.;

N - количество особей (экземпляров) одного вида, уничтоженных либо незаконно добытых, включая отдельные яйца птиц и рептилий, экз.;

HC - норматив стоимости объекта животного мира данного вида, определенный в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящей Методике, руб./экз.;

К - показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный;

I_t

$K = K \times (1 + UI/100)$, где UI - уровень инфляции,

I_t I_{t-1} установленный в Федеральном законе Российской Федерации о бюджете Российской Федерации на год исчисления размера вреда (t) по отношению к предыдущему году (t-1).

В расчетах применяется максимальная величина, если приведены два значения уровня инфляции; если указано, что уровень инфляции не превышает определенную величину, в расчетах принимается указанная величина. В год утверждения Методики $K = 1$.

I_t

6. При уничтожении либо незаконном добывании кладок яиц птицы или рептилии размер вреда исчисляется в пятикратном размере по отношению к размеру вреда от уничтожения либо незаконного добывания одной особи данного вида, исчисляемому по формуле N 1.

7. При уничтожении либо незаконном добывании кладок икры амфибии размер вреда исчисляется в десятикратном размере по отношению к размеру вреда от уничтожения либо незаконного добывания одной особи данного вида, исчисляемому по формуле N 1.

8. Исчисление размера вреда от уничтожения объектов животного мира, относящихся к почвенным беспозвоночным животным, производится в составе исчисления размера вреда от уничтожения почвы (подстилки) по формуле N 3.

9. Исчисление размера вреда от уничтожения других объектов животного мира, относящихся к беспозвоночным животным, производится в составе исчисления размера вреда от уничтожения их местообитаний по формуле N 3.

10. В случае, если вред причинен нескольким видам объектов животного мира, размер вреда исчисляется по формуле N 2:

N

Вж = сумма В

$i = 1 \text{ ожм}i$,

где:

В - общий размер вреда, причиненного нескольким видам

ж объектов животного мира, руб.;

В - размер вреда, причиненного объектам животного мира

ожм i -го вида, $i = 1, 3 \dots N$, руб.;

N - общее число видов объектов животного мира, руб.

III. Исчисление размера вреда, причиненного среде обитания объектов животного мира

11. При уничтожении либо запечатывании (асфальтировании, бетонировании или покрытии иными материалами) почвы (подстилки) и иных местообитаний объектов животного мира, относящихся к беспозвоночным животным, размер вреда исчисляется исходя из затрат, которые необходимо произвести для замены почвенного слоя растительным грунтом по формуле N 3:

$B = 3 \times V + HC \times S \times K + HC \times S \times K$,

почв кр пб I_t иб I_t

где:

В - размер вреда, причиненного среде обитания объектов

почв животного мира, руб.;

З - затраты на выполнение комплекса работ, связанных с

кр приобретением, транспортировкой и размещением растительного грунта, по замене уничтоженной либо запечатанной почвы (подстилки) и иных

З местообитаний, руб./м ;

V - объем уничтоженной либо запечатанной почвы (подстилки),

3 м ;

НС - норматив стоимости почвенных беспозвоночных животных,
пб 2 обитающих на 1 м земельного участка, определенный в соответствии с
2 приложением 1, руб./м ;

S - площадь земельного участка, на котором уничтожены либо запечатаны почва (подстилка) и иные
места обитания беспозвоночных
2 животных, м ;

НС - норматив стоимости объектов животного мира, относящихся
и к иным беспозвоночным животным, в соответствии с приложением 1, руб./экз.

12. При разрушении обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ
и других сооружений объектов животного мира, относящихся к позвоночным животным,
используемых для воспроизводства (размножения), размер вреда исчисляется по формуле N 4:

$$B = K \times HC \times K + 3B,$$

гн воспр м Ит

где:

B - размер вреда, причиненного разрушением гнезд, нор,
гн логовищ, убежищ, жилищ позвоночных животных, руб.;

K - коэффициент воспроизводства:

воспр

K = 10 - для земноводных и пресмыкающихся;

воспр

K = 5 - для птиц и млекопитающих;

воспр

НС - норматив стоимости объекта животного мира, относящегося

к позвоночным животным, определенный в соответствии с приложениями 1 и 2, руб./экз.;

3B - затраты на восстановление (проведение биотехнических мероприятий или создание
искусственного аналога) используемого гнезда, норы, логовища, убежища и (или) другого
сооружения, используемого для воспроизводства (размножения), руб.

13. При устранимом повреждении среды обитания объектов животного мира, кроме почвенных
беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных, приводящем к сокращению их
численности, размер вреда исчисляется по формуле N 5:

$$B = 3Y + N \times HC \times K + 3O,$$

пс сч Ит

где:

B - размер вреда, исчисляемый при устранимом повреждении

пс среды обитания объектов животного мира, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов
беспозвоночных животных, руб.;

3Y - затраты на устранение повреждения среды обитания объектов животного мира, кроме
почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных, исчисляются на основе данных
о стоимости основных видов работ и (или) на основании данных о необходимых и фактически
произведенных расходах, руб.;

N - сокращение численности объектов животного мира одного

сч вида, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных, включая полную
потерю численности, экз.;

НС - норматив стоимости объекта животного мира, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов
беспозвоночных животных, определенный в соответствии с приложениями 1 и 2, руб./экз.;

3O - затраты, необходимые для оценки вреда, исчисляются на основе данных о стоимости основных
видов работ и (или) на основании данных о необходимых и фактически произведенных расходах,

руб.

Сокращение численности объектов животного мира определяется как разность между численностью объектов животного мира на оцениваемой площади до установления факта нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об охране и использовании животного мира и среды его обитания, в том числе на площади, непосредственно к ней примыкающей, и численностью объектов животного мира на оцениваемой площади на дату установления факта нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об охране и использовании животного мира и среды его обитания.

14. При уничтожении среды обитания объектов животного мира, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных, приводящем к сокращению их численности, размер вреда исчисляется по формуле N 6:

$$B = N \times HC \times K \times K + ZO,$$

ус сч Ит бп

где:

B - размер вреда, причиненного уничтожением среды обитания

ус объектов животного мира, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных, руб.;

N - сокращение численности объектов животного мира одного

сч вида, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных, включая полную потерю численности, экз.;

HC - норматив стоимости объекта животного мира данного вида, определенный в соответствии с приложениями 1 и 2, руб./экз.;

ZO - затраты, необходимые для оценки вреда, исчисляются на основе данных о стоимости основных видов работ и (или) на основании данных о необходимых и фактически произведенных расходах, руб.;

K - коэффициент учета стоимости будущих поколений животных, бп б/размерный:

K = 10 - для объектов животного мира, занесенных в Красную

бп книгу Российской Федерации;

K = 1 - для остальных объектов животного мира.

бп

15. В случае, если причинен вред среде обитания нескольких видов объектов животного мира, исчисление размера вреда производится по формуле N 7:

M

$$B = \sum B_j,$$

ср j = 1 срj

где:

B - общий размер вреда, причиненный среде обитания

ср нескольких видов объектов животного мира, руб.;

B_j - вред, причиненный среде обитания j-го вида объекта

срj животного мира, j = 1, 2 ... M, руб.;

M - общее число видов объектов животного мира, среде обитания которых причинен вред.

Приложение 1

к Методике

Н О Р М А Т И В Ы

стоимости объектов животного мира, не относящихся к видам,

занесенным в Красную книгу Российской Федерации +-----+ |

Виды объектов животного мира | Единица | Норматив | | измерения | стоимости | | | в рублях | +-----

+-----+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | +-----+-----+-----+ | |

Беспозвоночные животные | | +-----+-----+-----+ | Кольчатые черви,
почвенные моллюски и др. | | | почвенные беспозвоночные животные | | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | | 2 | | Зона арктических пустынь | руб./м | 22 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Зона тундры | "-" | 26 | +-----+-----+-----+ | Зона
лесотундры | "-" | 46 | +-----+-----+-----+ | Зона тайги | "-" | 66 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Зона смешанных лесов | "-" | 143 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Зона широколиственных лесов | "-" | 220 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Лесостепная зона | "-" | 220 | +-----+-----+-----+ | Степная зона: | |

| +-----+-----+-----+ | черноземная степь | "-" | 484 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | луговая степь | "-" | 88 | +-----+-----+-----+ |

| сухая степь | "-" | 44 | +-----+-----+-----+ | Тип Членистоногие - Phylum
Arthropoda | | | +-----+-----+-----+ | | 2 | | Класс Насекомые - Classis
Insecta | руб./м | 50 | +-----+-----+-----+ | Позвоночные животные | | | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Класс Земноводные - Classis Amphibia | | | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Хвостатые - Ordo Caudata (тритоны) | "-" | 100 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Бесхвостые - Ordo Anura (лягушки) | "-" | 100 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Класс Пресмыкающиеся - Classis Reptilia | | | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Черепахи - Ordo Testudines | руб./экз. | 1000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Ящерицы - Ordo Sauria | "-" | 500 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Змеи - Ordo Serpentes | "-" | 3000 | +-----+-----+-----+ |

| Класс Птицы - Classis Aves | | | +-----+-----+-----+ | Отряд
Гагарообразные - Ordo Gaviiformes | руб./экз. | 3000 | +-----+-----+-----+ |

| Отряд Поганкообразные - Ordo Podicipedi- | "-" | 2000 | | formes | | | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Трубноносые - Ordo Procellariiformes | "-" | 3000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Веслоногие - Ordo Pelecaniformes | "-" | 3000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Аистообразные - Ordo Ciconiiformes | "-" | 10000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Гусеобразные - Ordo Anseriformes | "-" | 3000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Соколообразные - Ordo Falconiformes | "-" | 5000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Журавлеобразные - Ordo Gruiformes | "-" | 10000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Ржанкообразные - Ordo Charadrii- | "-" | 1000 | | formes | | | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Кукушкообразные - Ordo Cuculiformes | "-" | 2000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Собообразные - Ordo Strigiformes | "-" | 5000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Козодоеобразные - Ordo Caprimulgi- | "-" | 2000 | | formes | | | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Стрижеобразные - Ordo Apodiformes | "-" | 1000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Ракшеобразные - Ordo Coraciiformes | "-" | 3000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Дятлообразные - Ordo Piciformes | "-" | 3500 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Воробьинообразные - Ordo Passeri- | "-" | 1000 | | formes | | | +-----+-----+-----+ |

| | +-----+-----+-----+ | Класс Млекопитающие - Classis Mammalia | | | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд Насекомоядные - Ordo Insectivora | | | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Семейство Ежовые | руб./экз. | 1000 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Семейство Землеройковые | "-" | 100 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Семейство Кротовые | "-" | 100 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд
Рукокрылые - Ordo Chiroptera | "-" | 1500 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Отряд
Грызуны - Ordo Rodentia | | | +-----+-----+-----+ | Семейство Мышиные | "-" | 100 | +-----+-----+-----+ |

+-----+-----+-----+ | Семейство Мышовковые | "-" | 100 | +-----+-----+-----+ |

-----+-----+-----| Семейство Соневые | "-" | 500 | +-----+-----+-----
 -----+-----| Семейство Тушканчиковые | "-" | 500 | +-----+-----+-----|
 Семейство Летяговые (Pteromyidae) | "-" | 1000 | +-----+-----+-----|
 Семейство Слепышовые | "-" | 500 | +-----+-----+-----| Семейство
 Хомяковые | "-" | 200 | +-----+-----+-----

Приложение 2

к Методике

Н О Р М А Т И В Ы стоимости объектов животного мира,

занесенных в Красную книгу Российской Федерации +-----+-----+-----|
 | Единица | Норматив | | Виды объектов животного мира | измерения | стоимости | | (независимо | в
 рублях | | от размера, | | | возраста | | | и пола) | | +-----+-----+-----| |
 1 | 2 | 3 | +-----+-----+-----| Беспозвоночные животные | | | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----| Класс Ракообразные - Classis Crustacea | руб./экз. | 500 | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----| Класс Насекомые - Classis Insecta | | | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----| Отряд Стрекозы - Ordo Odonata | руб./экз. | 1500 | +-----+-----+-----
 -+-----+-----| Отряд Прямокрылые - Ordo Orthoptera | "-" | 3000 | +-----+-----+-----+-----
 -----+-----| Отряд Жесткокрылые - Ordo Coleoptera | "-" | 3000 | | (жужелицы - жуки) | | | +-----+-----
 -----+-----+-----| Отряд Перепончатокрылые - Ordo Hymenoptera | "-" | 3000 | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----| Отряд Чешуекрылые - Ordo Lepidoptera | "-" | 3000 | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----| | Позвоночные животные | | | +-----+-----+-----+-----
 -----+-----| Класс Земноводные - Classis Amphibia | | | +-----+-----+-----+-----
 ----| Отряд Хвостатые - Ordo Caudata | руб./экз. | 3000 | +-----+-----+-----+-----|
 | Отряд Бесхвостые - Ordo Anura | "-" | 3000 | +-----+-----+-----+-----| Класс
 Пресмыкающиеся - Classis Reptilia | | | +-----+-----+-----+-----| Отряд
 Черепахи - Ordo Testudines | "-" | 15000 | +-----+-----+-----+-----| Отряд
 Ящерицы - Ordo Sauria | "-" | 5000 | +-----+-----+-----+-----| Отряд Змеи - Ordo
 Serpentes | "-" | 15000 | +-----+-----+-----+-----| Класс Птицы - Classis Aves | | |
 +-----+-----+-----| Отряд Гагарообразные - Ordo Gaviiformes | | | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----| Европейская чернозобая гагара - | руб./экз. | 10000 | | Gavia
 arctica arctica | | | (центральноевропейская популяция) | | | +-----+-----+-----+-----
 -----| Белоклювая гагара - Gavia adamsii | "-" | 25000 | +-----+-----+-----+-----|
 | Отряд Трубконосые - Ordo Procellariiformes | | | +-----+-----+-----+-----|
 | Белоспинный альбатрос - Diomedea albatrus | руб./экз. | 75000 | +-----+-----+-----+-----
 -+-----| Пестролицый буревестник - Calonectris | "-" | 25000 | | leucomelas | | | +-----+-----
 -----+-----+-----| Малая качурка - Oceanodroma monorhis | "-" | 10000 | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----| Отряд Веслоногие - Ordo Pelecaniformes | | | +-----+-----+-----
 -----+-----| Розовый пеликан - Pelecanus onocrotalus | "-" | 50000 | +-----+-----+-----
 -----+-----| Кудрявый пеликан - Pelecanus crispus | "-" | 50000 | +-----+-----+-----
 +-----| Хохлатый баклан - Phalacrocorax aristotelis | "-" | 25000 | +-----+-----+-----
 -+-----| Малый баклан - Phalacrocorax pygmaeus | "-" | 25000 | +-----+-----+-----
 +-----| Отряд Аистообразные - Ordo Ciconiiformes | | | +-----+-----+-----
 -| Египетская цапля - Bubulcus ibis | руб./экз. | 10000 | +-----+-----+-----+-----|
 | Средняя белая цапля - Egretta intermedia | "-" | 10000 | +-----+-----+-----+-----|
 | Желтоклювая цапля - Egretta eulophotes | "-" | 50000 | +-----+-----+-----+-----|
 | Колпица - Platalea leucorodia | "-" | 50000 | +-----+-----+-----+-----| Каравайка -
 Plegadis falcinellus | "-" | 25000 | +-----+-----+-----+-----| Красноногий ибис -
 Nipponia nippon | "-" | 150000 | +-----+-----+-----+-----| Дальневосточный аист -

Ciconia boyciana |-|- |100000 | +-----+-----+-----| Черный аист - *Ciconia nigra* |-|- |50000 | +-----+-----+-----| Отряд Фламингообразные - Ordo | |
| |Phoenicopteriformes | | | +-----+-----+-----| Обыкновенный фламинго - *Phoenicopus* |руб./экз. |50000 | |roseus | | | +-----+-----+-----| Отряд
Гусеобразные - Ordo Anseriformes | | | +-----+-----+-----| Алеутская
канадская казарка - *Branta* |руб./экз. |25000 | |canadensis leucopareia | | | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Атлантическая черная казарка - *Branta* |-|- |25000 | |bernicla hrota | | | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Американская казарка - *Branta nigricans* |-|- |10000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Краснозобая казарка - *Rufibrenta ruficollis* |-|- |25000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Пискулька - *Anser erythropus* |-|- |25000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Белошей - *Philacte canagica* |-|- |50000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Горный гусь - *Eulabeia indica* |-|- |50000 | +-----+-----+-----|
|Сухонос - *Cygnopsis cygnoides* |-|- |75000 | +-----+-----+-----| Малый
лебедь - *Cygnus bewickii* |-|- |25000 | +-----+-----+-----| Американский
лебедь - *Cygnus columbianus* |-|- | | +-----+-----+-----| Хохлатая пеганка
- *Tadorna cristata* |-|- |150000 | +-----+-----+-----| Клоктун - *Anas formosa*
|-|- |25000 | +-----+-----+-----| Мраморный чирок - *Anas angustirostris* |-|-
|75000 | +-----+-----+-----| Мандаринка - *Aix galericulata* |-|- |25000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Нырок (чернеть) Бэра - *Aythya Baeri* |-|- |25000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Белоглазый нырок (чернеть) - *Aythya nyroca* |-|- |25000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Савка - *Oxyura leucoccephala* |-|- |50000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Чешуйчатый крохаль - *Mergus squamatus* |-|- |50000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Отряд Соколообразные - Ordo Falconiformes | | | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Скопа - *Pandion haliaetus* |руб./экз |25000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Красный коршун - *Milvus milvus* |-|- |50000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Степной лунь - *Circus macrourus* |-|- |10000 | +-----+-----+-----|
|Европейский тювик - *Accipiter brevipes* |-|- |10000 | +-----+-----+-----|
|Курганник - *Buteo rafinus* |-|- |10000 | +-----+-----+-----| Ястребиный
сарыч - *Butastur indicus* |-|- |10000 | +-----+-----+-----| Змеяед -
Circaetus gallicus |-|- |50000 | +-----+-----+-----| Хохлатый орел -
Spizaetus nipalensis |-|- |50000 | +-----+-----+-----| Степной орел - *Aquila*
гарах |-|- |50000 | +-----+-----+-----| Большой подорлик - *Aquila clanga* |-
|-|- |25000 | |(популяции европ. части России) | | | +-----+-----+-----|
|(популяции Дальнего Востока) |-|- |25000 | +-----+-----+-----| Малый
подорлик - *Aquila pomarina* |-|- |25000 | +-----+-----+-----| Могильник -
Aquila heliaca |-|- |100000 | +-----+-----+-----| Беркут - *Aquila chrysaetos*
|-|- |100000 | +-----+-----+-----| Орлан-долгохвост - *Haliaeetus*
leucoryphus |-|- |100000 | +-----+-----+-----| Орлан-белохвост -
Haliaeetus albicilla |-|- |100000 | +-----+-----+-----| Белоголовый орлан -
Haliaeetus |-|- |100000 | |leucoccephalus | | | +-----+-----+-----|
|Белоплечий орлан - *Haliaeetus pelagicus* |-|- |100000 | +-----+-----+-----|
|Бородач - *Gypaetus barbatus* |-|- |100000 | +-----+-----+-----|
|Стервятник - *Neophron percnopterus* |-|- |50000 | +-----+-----+-----|
|Черный гриф - *Aegypius monachus* |-|- |100000 | +-----+-----+-----|
|Белоголовый сип - *Gyps fulvus* |-|- |75000 | +-----+-----+-----| Кречет -
Falco rusticolus |-|- |250000 | +-----+-----+-----| Балобан - *Falco cherrug* |-
|-|- |150000 | +-----+-----+-----| Кансан - *Falco peregrinus* |-|- |100000 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| Степная пустельга - *Falco naumanni* |-|- |50000 | +-----+-----+-----|

-----+-----+-----| |Отряд Курообразные - Ordo Gaffiformes | | +-----
-----+-----+-----| |Среднерусская белая куропатка - |руб./экз. |25000 | |Lagopus lagopus
rossicus | | +-----+-----+-----| |Кавказский тетерев - Lyrurus
mlokosiewiczii |-|- |10000 | +-----+-----+-----| |Дикуша - Falci pennis
falci pennis |-|- |25000 | +-----+-----+-----| |Манчжурская бородастая
куропатка - Perdix |-|- |10000 | |dauurica suschkini | | +-----+-----+-----|
|Отряд Журавлеобразные - Ordo Gruiformes | | +-----+-----+-----|
|Японский (уссурийский) журавль - Grus |руб./экз. |150000 | |japonensis | | +-----+-----+-----
----+-----+-----| |Стерх - Grus leucogeranus (обская |-|- |150000 | |популяция) | | +-----+-----+-----
-----+-----+-----| |(якутская популяция) |-|- | | +-----+-----+-----+-----
-----| |Даурский журавль - Grus vipio |-|- |100000 | +-----+-----+-----+-----|
Черный журавль - Grus monacha	-	-	75000	+-----+-----+-----+-----
Красавка - Anthopoides virgo	-	-	50000	+-----+-----+-----+-----
Белокрылый погоныш - Porzana exquisita	-	-	10000	+-----+-----+-----+-----
Рогатая камышница - Gallicrex cinerea	-	-	10000	+-----+-----+-----+-----
Султанка - Porphyrio porphyrio	-	-	10000	+-----+-----+-----+-----
Otis tarda а) европейский п/вид - |-|- |25000 | |O. t. tarda | | +-----+-----+-----+-----
-----| |б) восточносибирский п/вид - |-|- |50000 | |O. t. dybowskii | | +-----+-----+-----+-----
----+-----+-----| |Стрепет - Tetrax tetrax |-|- |50000 | +-----+-----+-----+-----| |Джек
- Chlamydotis undulata |-|- |25000 | +-----+-----+-----+-----| |Отряд
Ржанкообразные - Ordo | | |Charadriiformes | | +-----+-----+-----+-----|
|Авдотка - Burhinus oedichnemus |руб./экз. |75000 | +-----+-----+-----+-----|
|Южная золотистая ржанка - Pluvialis |-|- |10000 | |apricaria apricaria | | +-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----| |Уссурийский зуек - Charadrius placidus |-|- |10000 | +-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----| |Каспийский зуек - Charadrius asiaticus |-|- |10000 | +-----+-----+-----+-----
----+-----+-----| |Кречетка - Chettusia gregaria |-|- |10000 | +-----+-----+-----+-----|
|Ходулочник - Himantopus himantopus |-|- |50000 | +-----+-----+-----+-----|
|Шилоклювка - Recurvirostra avosetta |-|- |10000 | +-----+-----+-----+-----|
|Кулик-сорока - Haematopus ostralegus |-|- |10000 | |а) материковый п/вид - Н. о. longipes | | +-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----| |б) дальневосточный п/вид - Н. о. osculans |-|- |10000 | +-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----| |Охотский улит - Tringa guttifer |-|- |10000 | +-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----| |Лопатень - Euryrhynchus pygmeus |-|- |75000 | +-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----| |Чернозобик - Calidris alpina а) балтийский |-|- |50000 | |п/вид - С. а. schinzii | | +-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----| |б) сахалинский п/вид - С. а. actitis |-|- |25000 | +-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----| |Южнокамчатский берингийский песочник - |-|- |25000 |
|Calidris ptilocnemis kurilensis | | +-----+-----+-----+-----| |Желтозобик -
Tryngites subruficollis |-|- |50000 | +-----+-----+-----+-----| |Японский бекас -
Gallinago hardwickii |-|- |10000 | +-----+-----+-----+-----| |Тонкоклювый
кроншнеп - Numenius |-|- |10000 | |tenuirostris | | +-----+-----+-----+-----|
|Большой кроншнеп - Numenius arquata |-|- |100000 | |(популяции южной и средней полосы | | +-----+-----+-----+-----
|европейской части России) | | +-----+-----+-----+-----| |Дальневосточный
кроншнеп - Numenius |-|- |25000 | |madagascariensis | | +-----+-----+-----+-----
-| |Азиатский бекасовидный веретенник - |-|- |25000 | |Limnodromus semipalmatus | | +-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----| |Степная тиркушка - Glareola nordmanni |-|- |25000 | +-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----| |Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus |-|- |10000 | +-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----| |Реликтовая чайка - Larus relictus |-|- |10000 | +-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----| |Китайская чайка - Larus saundersi |-|- |50000 | +-----+-----+-----+-----
-----+-----+-----+-----| |Красноногая говорушка - Rissa brevirostris |-|- |10000 | +-----+-----+-----+-----

+-----+-----| |Белая чайка - Pagophila eburnea |-|- |10000 | +-----+-----
+-----| |Чеграва - Hydroprogne caspia |-|- |10000 | +-----+-----+-----|
|Алеутская (камчатская) крачка - |-|- |10000 | |Sterna aleutica | | | +-----+-----
---+-----| |Малая крачка - Sterna albifrons |-|- |10000 | +-----+-----+-----|
|Азиатский длинноклювый пыхик - |-|- |10000 | |Brachyramphus marmoratus perdis | | | +-----
-----+-----+-----| |Короткоклювый пыхик - Brachyramphus |-|- |10000 | |brevirostris | | |
+-----+-----+-----| |Хохлатый старик - Synthliboramphus |-|- |10000 |
|wumizusume | | | +-----+-----+-----| |Отряд Собообразные - Ordo
Strigiformes | | | +-----+-----+-----| |Филин - Bubo bubo |руб./экз. |50000 |
+-----+-----+-----| |Рыбный филин - Ketupa blakistoni |-|- |100000 | +-----
-----+-----+-----| |Отряд Ракшеобразные - Ordo Coraciiformes |-|- |10000 | +-----
-----+-----+-----| |Большой пегий зимородок - Ceryle lugubris |-|- |10000 | +-----
-----+-----+-----| |Ошейниковый зимородок - Halcyon pileata |-|- |10000 |
+-----+-----+-----| |Отряд Дятлообразные - Ordo Piciformes | | | +-----
-----+-----+-----| |Европейский средний дятел - Dendrocopus |руб./экз. |10000 |
|medius medius | | | +-----+-----+-----| |Рыжебрюхий дятел - Dendrocopus
hyperythrus |-|- |10000 | +-----+-----+-----| |Отряд Воробьинообразные -
Ordo | | | |Passeriformes | | | +-----+-----+-----| |Монгольский жаворонок -
Melanocorypha |руб./экз. |10000 | |mongolica | | | +-----+-----+-----|
|Обыкновенный серый сорокопут - Lanius |-|- |10000 | |excubitor excubitor | | | +-----
-----+-----+-----| |Японская камышевка - Megaluros pryori |-|- |10000 | +-----
-----+-----+-----| |Вертлявая камышевка - Acrocephalus |-|- |10000 | |paludicola | | | +-----
-----+-----+-----| |Райская мухоловка - Terpsiphone paradisi |-|- |10000 | +-----
-----+-----+-----| |Большой чекан - Saxicola insignis |-|- |25000 | +-----
-----+-----+-----| |Тростниковая сutora - Paradoxornis |-|- |25000 | |polivanovi | | | +-----
-----+-----+-----| |Европейская белая лазоревка - |-|- |10000 | |Parus cyaneus cyaneus | | |
+-----+-----+-----| |Косматый поползень - Sitta villosa |-|- |25000 | +-----
-----+-----+-----| |Овсянка Янковского - Emberiza Jankowskii |-|- |50000 | +-----
-----+-----+-----| |Класс Млекопитающие - Classis Mammalia | | | +-----
-----+-----+-----| |Отряд Насекомоядные - Ordo Insectivora | | | +-----
-----+-----+-----| |Даурский еж - Erinaceus dauuricus |руб./экз. |5000 | +-----
-----+-----+-----| |Русская выхухоль - Desmana moschata |-|- |50000 | +-----
-----+-----+-----| |Японская могоера - Mogera wogura |-|- |5000 | +-----+-----
-----+-----+-----| |Гигантская бурозубка - Sorex mirabilis |-|- |5000 | +-----+-----
+-----| |Отряд Рукокрылые - Ordo Chiroptera | | | +-----+-----+-----|
|Малый подковонос - Rhinolophus hipposideros|-|- |5000 | +-----+-----+-----
--| |Подковонос Мегели - Rhinolophus Mehelyi |-|- |5000 | +-----+-----+-----
-| |Большой подковонос - Rhinolophus |-|- |5000 | |ferrumequinum | | | +-----+-----
-----+-----| |Остроухая ночница - Myotis blythi |-|- |5000 | +-----+-----+-----
-----| |Трехцветная ночница - Myotis emarginatus |-|- |5000 | +-----+-----+-----
-----| |Гигантская вечерница - Nyctalus lasiopterus|-|- |5000 | +-----+-----+-----
-----| |Обыкновенный длиннокрыл - Miniopterus |-|- |5000 | |schreibersi | | | +-----
--+-----+-----| |Отряд Грызуны - Ordo Rodentia | | | +-----+-----+-----
| |Тарбаган (монгольский) сурок - Marmota |-|- |15000 | |sibirica (тувинская популяция) | | | +-----
-----+-----+-----| | (читинская популяция) |-|- |15000 | +-----
+-----+-----| |Прибайкальский черношапочный сурок - |-|- |15000 | |Marmota camtschatica
doppelmayeri | | | +-----+-----+-----| |Речной бобр - Castor a)
западносибирский |-|- |50000 | |п/вид - C. f. pohlei | | | +-----+-----+-----|

|б) тувинский п/вид - *C. f. tuvinicus* |-" |50000 | +-----+-----+-----+
 |Гигантский слепыш - *Spalax giganteus* |-" |5000 | +-----+-----+-----+
 |Маньчжурский цокор - *Myospalax psilurus* |-" |5000 | *aspilanus* | | +-----+-----+
 -----+-----+ |Желтая пеструшка - *Eolagurus luteus* |-" |15000 | +-----+-----+
 +-----+ |Отряд Хищные - *Ordo Carnivora* | | +-----+-----+-----+
 |Медновский голубой песец - *Alopex lagopus* |руб./экз. |70000 | *semenovi* | | +-----+
 -----+-----+-----+ |Красный волк - *Cuon alpinus* |-" |75000 | +-----+-----+
 -+-----+ |Белый медведь - *Ursus maritimus* |-" |100000 | |(карско-баренцевоморская популяция) | | +
 -----+-----+-----+ |(лаптевская популяция) |-" |100000 | +-----+
 -----+-----+-----+ |(чукотско-алаянская популяция) |-" |100000 | +-----+
 -----+-----+-----+ |Солонгой - *Mustela altaica raddei* |-" |30000 | |(дальневосточная популяция)
 | | +-----+-----+-----+ |Амурский степной хорь - *Mustela eversmanni* |-"
 |30000 | *amurensis* | | +-----+-----+-----+ |Кавказская европейская
 норка - *Mustela* |-" |40000 | *lutreola turovi* | | +-----+-----+-----+
 |Перевязка - *Vormela peregusna* |-" |40000 | +-----+-----+-----+
 |Кавказская выдра - *Lutra lutra meridionalis* |-" |40000 | +-----+-----+-----+
 |Калан - *Enhydra lutris* |-" |80000 | +-----+-----+-----+ |Кавказская лесная
 кошка - *Felis silvestris* |-" |30000 | *caucasica* | | +-----+-----+-----+
 |Кавказский камышовый кот - |-" |30000 | *Felis chaus chaus* | | +-----+-----+
 -+-----+ |Манул - *Felis manul* |-" |50000 | +-----+-----+-----+ |Амурский
 тигр - *Panthera tigris altaica* |-" |500000 | +-----+-----+-----+ |Леопард -
Panthera pardus |-" |500000 | +-----+-----+-----+ |Снежный барс - *Uncia*
uncia |-" |300000 | +-----+-----+-----+ |Отряд Непарнокопытные - *Ordo*
Petissodactyla | | +-----+-----+-----+ |Лошадь Пржевальского - *Equus*
Przewalskii |руб./экз. |150000 | +-----+-----+-----+ |Кулан - *Equus*
hemionus |-" |150000 | +-----+-----+-----+ |Отряд Парнокопытные - *Ordo*
Artiodactyla | | +-----+-----+-----+ |Сахалинская кабарга - *Moschus*
moschiferus |руб./экз. |120000 | *sachalinensis* | | +-----+-----+-----+
 |Уссурийский пятнистый олень - *Cervus nippon* |-" |20000 | *hortulorum* (аборигенные популяции) | | +
 -----+-----+-----+ |Северный олень - *Rangifer tarandus* |-" |20000 | |а)
 лесной п/вид - *R. t. fennicus* | | |(алтае-саянская популяция) | | +-----+-----+
 ---+-----+ |б) новоземельский п/вид - *R. t. pearsoni* |-" |20000 | +-----+-----+
 -+-----+ |Зубр - *Bison* а) беловежский п/вид - |-" |120000 | *B. b. bonasus* | | +-----+
 -----+-----+ |б) внутривидовые гибридные формы |-" |10000 | +-----+-----+
 -+-----+-----+ |Дзерен - *Procapra gutturosa* |-" |30000 | +-----+-----+
 ----+ |Амурский горал - *Naemorhaedus caudatus* |-" |100000 | +-----+-----+
 -----+ |Безоаровый козел - *Capra aegagrus* |-" |100000 | +-----+-----+
 | |Алтайский горный баран - *Ovis ammon ammon* |-" |300000 | +-----+-----+
 +-----+ |Снежный баран - *Ovis* а) путоранский п/вид |-" |100000 | *O. p. borealis* | | +-----+
 -----+-----+ |б) якутский п/вид - *O. p. lydekkeri* |-" |100000 | |(чукотская популяция)
 | | +-----+-----+

Приложение 3

к Методике

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВРЕДА

Пример 1

При расширении карьера по добыче известняка на участке размером в 1 га при проведении
 взрывных работ был снят грунт на глубину до двух метров. Мощность уничтоженного почвенного

слоя - 0,5 м. В ходе работ вырублен лес и уничтожены подстилка и травянистый покров.

Документы, подтверждающие правомочность произведенных действий, отсутствуют.

В результате произведенных действий причинен вред среде обитания объектов животного мира:

1) уничтожены почва, подстилка и иные местообитания беспозвоночных животных, в том числе беспозвоночных животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации;

2) уничтожена среда обитания объектов животного мира, не относящихся к беспозвоночным животным.

Территория расположения участка относится к зоне смешанных лесов. Участок является средой обитания видов, характерных для данной природно-климатической зоны, в том числе:

- пресмыкающихся (ящерицы и змеи);

- птиц (отряд дятлообразные, отряд воробьинообразные, отряд удообразные);

- млекопитающих (семейство ежевых, семейство землеройковых, семейство мышиных, семейство мышовковых).

Участок также является средой обитания вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации,

- бабочки обыкновенный Аполлон.

1. Размер вреда, причиненного уничтожением почвы (подстилки) и иных местообитаний беспозвоночных животных, за исключением бабочки обыкновенный Аполлон, определяется по формуле N 3:

$$B = 3 \times V + HC \times S \times K + HC \times S \times K,$$

почв кр пб Ит иб Ит

где:

B - размер вреда, причиненного среде обитания объектов

почв животного мира, руб.;

З - затраты на выполнение комплекса работ, связанных с

кр приобретением, транспортировкой и размещением растительного грунта, по замене уничтоженной почвы (подстилки) и иных местообитаний;

З

$$З = 1000 \text{ руб./м} ;$$

кр

V - объем уничтоженной почвы (подстилки);

2 З

$$V = 10\,000 \text{ м} \times 0,5 \text{ м} = 5000 \text{ м} ;$$

HC - норматив стоимости почвенных беспозвоночных животных,

пб

2 обитающих на 1 м земельного участка, определенный в соответствии с приложением 1;

2

$$HC = 143 \text{ руб./м для зоны смешанных лесов;} ;$$

пб

S - площадь земельного участка, на котором уничтожены почва, подстилка и иные местообитания беспозвоночных животных, за исключением бабочки обыкновенный Аполлон;

2

$$S = 10\,000 \text{ м} ;$$

HC - норматив стоимости объектов животного мира, относящихся

иб к иным беспозвоночным животным (непочвенным), исключая беспозвоночных животных,

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в соответствии и приложением 1, руб./экз.;

$$HC = 50 \text{ руб./экз.};$$

иб

Ит Ит-1

где:

УИ - уровень инфляции, установленный в Федеральном законе Российской Федерации о бюджете Российской Федерации на год исчисления размера вреда (t) по отношению к предыдущему году (t-1). В расчетах применяется максимальная величина, если приведено два значения уровня инфляции; если указано, что уровень инфляции не превышает определенную величину, в расчетах принимается указанная величина.

Оценка вреда проведена в 2009 году.

Методика утверждена в 2008 году. Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" в 2009 году установлен уровень инфляции (УИ), не превышающий 6,5 процентов.

Отсюда $K = K \times (1 + 6,5 / 100) = 1,065$

Ит Ит-1

К - коэффициент учета стоимости будущих поколений животных;

бп

$K = 1$;

бп

ЗО - затраты, необходимые для оценки вреда, исчисляются на основе данных о стоимости основных видов работ и (или) на основании данных о необходимых и фактически произведенных расходах;

ЗО = 8000 руб. (оплата услуг экспертов);

Размер вреда составляет:

$V = 1000 \text{ экз.} \times 1500 \text{ руб./экз.} \times 1,065 \times 1 + 8000 \text{ руб.} =$

ус 1 605 500 руб.

(один миллион шестьсот пять тысяч пятьсот рублей).

Пример 3

19 января 2008 г. в N-ском районе был произведен незаконный отстрел дальневосточного леопарда.

Размер вреда определяется по формуле N 1:

$V = N \times НС \times K$,

ожм Ит

где:

V - размер вреда, причиненного объектам животного мира;

ожм

N - количество особей (экземпляров) одного вида, уничтоженных и (или) незаконно добытых, включая отдельные яйца птиц и рептилий;

$N = 1 \text{ экз.}$

НС - норматив стоимости объекта животного мира данного вида, определенный в соответствии с приложениями 1 и 2, руб./экз.;

НС = 500 000 руб./экз. согласно приложению 2.

K - показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный;

Ит

$K = K \times (1 + УИ/100)$,

Ит Ит-1

где:

УИ - уровень инфляции, установленный в Федеральном законе Российской Федерации о бюджете Российской Федерации на год исчисления размера вреда (t) по отношению к предыдущему году (t-1). В расчетах применяется максимальная величина, если приведено два значения уровня инфляции; если указано, что уровень инфляции не превышает определенную величину, в расчетах принимается указанная величина.

В год утверждения Методики $K = 1$.

Ит

Отсюда $K = 1$.

Ит

Размер вреда составляет:

$B = 1 \text{ экз.} \times 500\,000 \text{ руб./экз.} \times 1 = 500\,000 \text{ руб.} \times 1 =$

ожи 500 000 руб.

(пятьсот тысяч рублей).
