

Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации · № 325 · от 20.08.1996 · не указан

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.08.1996 г. № 325 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 1997 г., № 14)

П Р И К А З

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности
Российской Федерации
от 20 августа 1996 г. N 325

Об утверждении аптечки первой помощи
(автомобильной)

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
7 июля 1997 г. Регистрационный N 1342

В плане реализации Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и с целью снижения
числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП),
своевременному оказанию первой само- и взаимопомощи участниками
дорожных происшествий у т в е р ж д а ю:

1. Состав аптечки первой помощи (автомобильной) (приложение N 1).
2. Правила оказания первой само- и взаимопомощи (приложение N 2).

Приказываю:

1. Воронежской медицинской академии (ректор А.С.Фаустов) и Московскому медицинскому стоматологическому институту (Е.И.Соколов) в месячный срок разработать буклет с пиктограммами по правилам оказания первой само- и взаимопомощи для вложения в медицинскую аптечку.
2. Комитету по новой медицинской технике (Носковой Т.И.) при рассмотрении разработок медицинской аптечки первой помощи (автомобильной) руководствоваться данным приказом.
3. Считать недействующим на территории Российской Федерации приложение N 6 к приказу МЗ СССР N 3 от 4.01.83 г. "О профилактике дорожно-транспортных происшествий и совершенствовании системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях".
4. Управлению организации медицинской помощи населению (Карпеев А.А.) согласовать с Главным управлением ГАИ МВД России порядок и сроки введения аптечки первой помощи (автомобильной) нового наполнения.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления организации медицинской помощи населению Карпеева А.А.

Приложение N 1
к приказу Минздравмедпрома России

от 26.08.96 г.

N 325

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

(автомобильная)

СОСТАВ

1. Обезболивающие, противовоспалительные и средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях

1.1. Анальгин 0,5 N 10 1 уп.

1.2. Пакет-контейнер портативный гипотермический (охлаждающий) 1 шт.

Пункт. (Исключен - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2002 г. N 106)

1.3. Аспирин 1 уп.

2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран

2.1. Жгут кровоостанавливающий 1 шт.

2.2. Бинт стерильный 10*5 1 шт.

2.3. Бинт нестерильный 10*5 1 шт.

2.4. Бинт нестерильный 5*5 1 шт.

2.5. Атравматическая повязка МАГ с диоксином или нитратом серебра 8*10 для перевязки грязных ран 1 шт.

2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5*7,0 или 2*5 см 8 шт.

2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения с фурагином 6*10 см; 10*18 см 3 шт.

2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% 1 фл.

2.9. Лейкопластырь 1*500 или 2*500 или 1*250 см 1 шт.

2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный по N 1, 3, 6 1 шт.

2.11. Вата 50 г 1 уп.

3. Средства при болях в сердце

3.1. Нитроглицерин таб. N 40 или капс. N 20 (тринитралонг) 1 уп.

3.2. Валидол таб. или капс. 1 уп.

4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти

4.1. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-устройство-рот" 1 шт.

5. Средства при обмороке (коллапсе)

- 5.1. Аммиака раствор (нашатырный спирт) 1 фл.
- 6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т. д.
- 6.1. Энтеродез или уголь активированный в таблетках 2 шт./1 уп.
- 6.2. Уголь активированный в таб. 1 уп.
- 7. Средства при стрессовых реакциях
- 7.1. (Исключен - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2002 г. N 106)
- 8. Ножницы 1 шт.
- 9. Правила оказания само- и взаимопомощи 1 шт.
- 10. Футляр 1 шт.

Не допускается произвольная замена указанных в перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.

При использовании любого средства аптечку срочно нужно дополнить.

(Приложение в редакции Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.10.99 г. N 366; введено в действие с 1 января 2000 г.)

Приложение N 2

к приказу Минздравмедпрома России
от 20 августа 1996 г.
N 325

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ САМО- И ВЗАИМОПОМОЩИ

1. Травма:

ушибы, переломы, вывихи - боль, припухлость, патологическая подвижность, костная крепитация, боль при осевой нагрузке, укорочение конечности, выступление отломков в рану при открытом переломе. Обезболивание (1.1), фиксация (шинами, подручными средствами или фиксация руки к туловищу, нога к ноге), холод на место травмы (1.2).

2. Раны и кровотечение:

- а) Артериальное (кровь алая, вытекает пульсирующей струей). Наложить жгут (2.1) выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, наложить на рану повязку (2.2; 2.3; 2.4). Конечность зафиксировать, больному дать обезболивающее (1.1).
- б) Венозное, капиллярное (кровь темная, не пульсирует). Наложить на рану салфетку (2.8 или 2.9) и давящую повязку бинтом (2.2; 2.3; 2.4), холод на место травмы (1.2).
- в) На рану наложить стерильную повязку (2.2; 2.5), дать обезболивающее (1.1). Мелкие раны и ссадины обработать йодом или зеленкой (2.10) и заклеить бактерицидным пластырем (2.6; 2.7).

3. Ожоги

При обширных ожогах наложить стерильную повязку (2.2), дать обезболивающее (1.1).

4. Боли в сердце

Валидол (3.2) одну таблетку или нитроглицерин или тринитралонг (3.1) одну таблетку, 15 капель корвалола (7.1) в 50 мл воды.

5. Обморок

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт (5.1) на ватке.

6. Стрессовые реакции

Развести в 50 мл воды 30 капель корвалола (7.1) и дать выпить больному.

7. Сердечно-легочная реанимация

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание с использованием устройства (4.1) до прибытия медработника или восстановления дыхания и пульса.

8. Отравления

Промыть желудок. Развести на 100 мл воды 1 ст. ложку энтеросорбента (6.1) и дать больному выпить.

9. Поражение глаз

(Попадание инородных тел и веществ). Промыть глаза водой, закапать сульфацил натрия 3-5 капель (1.4).

(Приложение в редакции Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.10.99 г. N 366; введено в действие с 1 января 2000 г.)
